

Отделение лучевой и функциональной диагностики КГБУЗ АКГВВ

Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям. ФЭГДС:

1. Проинформировать больного, что исследование проводится утром натощак (последний прием пищи не позднее 19⁰⁰) накануне обследования;
2. В день исследования не пить, не курить, таблетки не принимать, слюну сплевывать, жевательную резинку не жевать;
3. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

RRS (ректороманоскопия):

1. Без шлаковая диета накануне исследования;
2. Слабительное по назначению лечащего врача:
 - a. При запорах – утром и в обед;
 - b. При нормальном опорожнении кишечника – утром.
3. Две очистительные клизмы вечером, утром – две клизмы не позднее, чем за 2 часа до исследования.

Колоноскопия:

1. Накануне в 14⁰⁰ последний прием пищи;
2. За 3 дня до исследования назначают безшлаковую диету;
3. Три дня утром и в обед слабительные по назначению лечащего врача;
4. Очистительные клизмы утром и вечером ежедневно в течение двух дней по назначению лечащего врача;
5. В день исследования – очистительная клизма не позднее чем за 2 часа до исследования;
6. Исследование проводится натощак;
7. При себе иметь чистую простынь;
8. При за 30-40 минут до исследования поставить обезболивающий препарат по назначению лечащего врача.

Бронхоскопия:

1. Натощак;
2. За 30 минут до исследования 1,0 атропина (по назначению врача);
3. При себе иметь чистое полотенце.

Лапароскопия:

1. Гигиеническая ванна;
2. Бритье за один час до исследования;
3. Опорожнение кишечника и мочевого пузыря;
4. Натощак;
5. Медикаментозная премедикация по назначению лечащего врача;
6. Подавать больного в операционную в лежачем положении, голого;
7. Сотрудники должны быть в колпаках и масках.

Подготовка больных к УЗ - исследованиям.

Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка):

1. За 3 дня до исследования профилактика метеоризма по назначению лечащего врача;
2. Без шлаковая диета; а так же исключить
 - a. Черный хлеб,
 - b. Бобовые,
 - c. Молоко,
 - d. Овощи,
 - e. Фрукты,
 - f. Соки.
3. Исследование проводится натощак;
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Исследование почки:

1. За 3 дня до исследования профилактика метеоризма по назначению лечащего врача;
2. Без шлаковая диета;
3. Исследование проводится натощак (пить можно);
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Исследование мочевого пузыря:

1. Простата исследуются при тугом заполнении мочевого пузыря;
2. Накануне исследования – профилактика метеоризма по назначению лечащего врача ;
3. В день исследования за 1,5-2 часа до исследования выпить 1-2 литра воды в течение 10-15 минут;
4. Соки, газированные напитки, минеральную воду пить нельзя;
5. До исследования не мочиться;
6. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Исследование простаты ректальным датчиком:

1. Очистительные клизмы вечером и утром (за 2 часа до исследования);
2. Наполнение мочевого пузыря за 1 ч до обследования
3. Ужин не позднее 19 ч;
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

УЗИ исследование поясничного отдела позвоночника

1. Профилактика метеоризма как при ирригоскопии;
2. Очистительные клизмы вечером до чистой воды;
3. Утром – за 2 часа до исследования;
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.
5. При себе иметь рентгеновские снимки позвоночника..

При УЗИ исследовании шейного отдела позвоночника и суставов

1. При себе иметь рентгеновские исследования нужного отдела .
2. Специальной подготовки не требуется

Подготовка больных к функциональным методам исследования.

Спирография:

1. Натощак;
2. Не пользоваться бронхолитиками и небулизацией за 2 часа до исследования;
3. Нельзя проводить обследование при температуре тела выше 37, явлениях ОРЗ, острой пневмонии, открытой форме туберкулеза легких.

ВЭМ (велозергометрия):

1. Больной должен позавтракать за 1-2 ч до обследования;
2. Не курить в течение 2-3-х часов до исследования;
3. Инъекции в/в делать нельзя за 2-3 часа до обследования;
4. За 12 часов до обследования исключить физические нагрузки;
5. Спортивная одежда, удобная обувь;
6. Перед велозергометрией не ходить на физиопроцедуры;
7. Обследование проводится после душа;
8. Алкогольные напитки не принимать в течение 7-10 дней до обследования;
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку

РЭГ, РВГ (рээнцефалография, реовазография):

1. При пробе с нитроглицерином, провести пробу за 1-2 суток до обследования (0,5 табл под язык) по назначению врача;
2. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

ЭКГ (электрокардиография):

1. С медикаментозными пробами иметь при себе препараты в расчете на 1 кг веса по назначению лечащего врача.
2. При выраженном волосеном покрове грудной клетки сбрить волосы перед обследованием.

ЭХО-КГ (эхокардиодопплерография):

1. Без специальной подготовки;
2. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Дуплексное сканирование (УЗИ – сосудов с ЦДК)

1. Верхние конечности – без специальной подготовки;
2. Брахиоцефальные сосуды:
 - Не курить в течение 2-3-х часов до исследования;
 - При себе иметь чистое полотенце или салфетку.
3. Нижние конечности:
 - При запорах – слабительное утром за день до исследования;
 - Утром за 2 часа до исследования очистительная клизма по согласованию с лечащим врачом;
 - Не обедать;
 - При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

ЭЭГ (электроэнцефалография)

1. Чистая голова;
2. Не курить в течение 2-3-х часов до исследования;
3. Не принимать алкогольные напитки в течение 3-4 дней до исследования;
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Холтеровское мониторирование ЭКГ.

1. При выраженном оволосении грудной клетки необходимо сбрить волосы перед обследованием.

ЭНМГ(электронейромиография), ЭХО-ЭГ(эхоэнцефалография).

Специальной подготовки не требуется.

Подготовка к рентгенологическим исследованиям.

Рентгеноскопия желудка:

1. Проинформировать больного, что ужин накануне исследования должен быть легким и не позднее 19⁰⁰;
2. Исследование проводится утром натощак (больной не должен пить, курить, принимать таблетки);
3. При запорах и метеоризме – в течение 3-х дней – бесшлаковая диета.

Ирригоскопия:

2. Ужин накануне не позднее 19⁰⁰;
3. Объяснить больному, что за 3 дня до исследования из рациона исключаются продукты, вызывающие метеоризм:
 - Черный хлеб,
 - Бобовые,
 - Молоко,
 - Овощи,
 - Фрукты,
 - Соки.
4. При метеоризме больному в течение 3-х дней профилактика метеоризма, по назначению лечащего врача ;
5. Накануне исследования больному дают слабительное по назначению лечащего врача:
 - a. При запорах – утром и в обед
 - b. Без запоров – в обед.
6. Вечером в 18⁰⁰ и в 20⁰⁰ очистительные клизмы (до чистой воды);
7. Утром не позднее чем за 2 часа до исследования – очистительная клизма до чистой воды;
8. Исследование проводится утром натощак;
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Внутривенная экскреторная урография:

1. Подготовка больных как при ирригоскопии;
2. Обзорная урография без введения контрастного вещества;
3. Экскреторная – контрастное вещество вводится по 1 мл на кг веса, но не менее 40 мл;
4. При проведении пробы обязательно выяснить у больного не было ли у него ранее признаков непереносимости йодсодержащих препаратов;
5. Провести пробу на урографин в отделении, согласно памятке за сутки до исследования;
6. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.

Рентгенография поясничного отдела позвоночника и костей таза:

6. Профилактика метеоризма как при ирригоскопии;
7. Очистительные клизмы вечером до чистой воды;
8. Утром – за 2 часа до исследования;
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку.